

2024 - 2025

KARPER

De karperkweek behoort tot de oudste vormen van visteelt. Nog altijd worden karpers gekweekt voor consumptie, het bezetten van natuurlijke wateren en voor commerciële visvijvers.



Zinkend voer



Drijvend voer



Semi-drijvend voer



Bevat geen eiwit van landdieren



Hoog verteerbaar



Omega-3 vetzuren



Ontworpen voor RAS



Duurzaamheidsscore



Bevat astaxanthine



Lage uitstoot van stikstof en fosfor



Verbeterde weerstand



AQUATE™

Verbeterde premix in alle Alltech Coppens voeders.

- + Optimaliseert de groei
- + Ondersteunt de immuunrespons
- + Optimaliseert de darmwerking
- + Draagt bij aan de bescherming van de slijmvliesbarrière
- + Draagt bij aan de bescherming van de externe barrière



BIO-MOS®

is een mannaanoligosacharide, waarvan bekend is dat hij optimistische bacteriën bindt en afvoert. Hierdoor kan de darmflora worden geoptimaliseerd. Ook de lengte en dichtheid van de microvilli in de darmen kunnen worden verhoogd, waardoor de voedingsstoffenopname kan toenemen. **BIO-MOS®** ondersteunt de immuun response.

ACTIGEN®

is gebaseerd op gistcelwanden en ondersteunt het immuunsysteem. **Actigen®** ondersteunt daardoor de algehele gezondheid van de vis en stimuleert zijn vitaliteit.

BIO-MOS®

Verbeterd
darmfunctie

BIOPLEX®

Verbeterd
prestaties

AQUATE™

ACTIGEN®

Helpt bij de
instandhouding
van het
immuunsysteem

TOTAL REPLACEMENT TECHNOLOGY®

BIOPLEX®

is een zeer belangrijk onderdeel van onze nieuwe premix. **BIOPLEX®** bestaat uit organisch gebonden sporenelementen zoals zink, koper, mangaan en ijzer. Met **BIOPLEX®** kunnen de gezondheid, groei en prestaties van de vis verbeterd worden.

**Doorbreek de traditie en
voed je dieren op een
moderne manier.**

Alltech heeft bewezen dat gechelateerde sporenelementen in de vorm van Bioplex® en Sel-Plex® in aanzienlijk lagere hoeveelheden opgenomen kunnen worden, terwijl de dierlijke prestaties toch verbeteren. Dit optimaliseert de behoefte van dieren aan mineralen en vermindert negatieve invloeden op het milieu. We noemen deze innovatie de Total Replacement Technology™ (TRT) van Alltech.



Karpervoeders schema

Traditionele
teelt

Semi-
intensief

Intensief

RAS



Granulaat


Advance



Micropellet

Intensiv

Advance



Pre groeivoer

Intensiv

Premium Select

Pre Grower-15 EF




Groeivoer

Intensiv

Premium Select

Grower-13 EF




Groeivoer met
astax

Grower Astax

Ouderdieren

Repro



- Ontworpen voor semi-intensive kweek
- Zeer goede prestaties
- Grote overlevingskans
- Middel energie startvoer



SAMENSTELLING:

Analyse (%)	0.2-0.3 mm	0.3-0.5 mm	0.5-0.8 mm	1.00 mm	1.5 mm
Eiwit	56	56	56	54	54
Vet	15	15	15	15	15
Ruwe celstof	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
As	11,3	11,3	11,3	9,6	9,6
Totaal P	1,77	1,77	1,77	1,66	1,66

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	16667	16667	16667	11999	11999
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Energie (MJ/kg)

Bruto	21,2	21,2	21,2	21,0	21,0
Verteerbaar	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3

VOERTABEL VOOR OPTIMALE GROEI


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	<10°C	10°C	12°C	14°C	16°C	18°C	20°C	22°C	24°C	26°C	>26°C
< 0.2	0.2-0.3	Volgens behoefte	Larven voeren tot verzadiging									
0.2-0.5	0.3-0.5		2,23	2,69	3,26	3,94	4,76	5,76	6,96	8,42	7,58	Volgens behoefte en O2 niveau
0.5-1.5	0.5-0.8		1,91	2,31	2,80	3,38	4,09	4,94	5,98	7,23	6,51	
1.5-5	0.5-0.8		1,66	2,01	2,43	2,94	3,56	4,30	5,21	6,29	5,67	
5.0-8.0	1.0-1.5		1,24	1,50	1,82	2,20	2,65	3,21	3,88	4,69	4,23	
8.0-15.0	1,5		1,10	1,33	1,61	1,94	2,35	2,84	3,43	4,15	3,74	

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Semi-intensieve kweek
- Goede prestaties
- Uitstekend voor voorn



SAMENSTELLING:

Analyse (%)

Eiwit	40	Maten:	1.5 mm
Vet	10		
Ruwe celstof	1,7		
As	7,4		
Totaal P	1,20		

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	13333
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Bruto	19,2
Verteerbaar	16,5

VOERTABEL VOOR EEN LAGE VOERCONVERSIE (FCR):


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
8-15	1,5		1,04	1,26	1,52	1,84	2,23	2,69	3,25	3,94	3,54	
25-50	2,0	Volgens behoefte	0,87	1,05	1,27	1,53	1,85	2,24	2,71	3,28	2,95	Volgens behoefte en O2 niveau

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Hoog energie voer
- Hoge aantrekkingskracht
- Goede prestaties
- Ontworpen voor semi-intensive kweek
- Goed om in de herfst te voeren



SAMENSTELLING:

Analyse (%)

Eiwit	32
Vet	15
Ruwe celstof	2,2
As	12,4
Totaal P	2,13

Maten:

2.0 mm

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	10002
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Bruto	18,9
Verteerbaar	15,8

VOERTABEL VOOR EEN LAGE VOERCONVERSIE (FCR):


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
15-25	2.0		1,06	1,28	1,55	1,87	2,26	2,73	3,31	4,00	3,60	
25-50	2.0	Volgens behoefte	0,93	1,13	1,36	1,65	1,99	2,41	2,92	3,53	3,17	Volgens behoefte en O2 niveau

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Medium energie voer
- Ontworpen voor semi-intensive kweek
- Goede prestaties



SAMENSTELLING:

Analyse (%)

Eiwit	40	Maten:	2.0 mm
Vet	10		
Ruwe celstof	1,7		
As	7,4		
Totaal P	1,20		

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	13333
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Bruto	19,2
Verteerbaar	16,5

VOERTABEL VOOR EEN LAGE VOERCONVERSIE (FCR):


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
15-25	2,0		1,04	1,26	1,52	1,84	2,23	2,69	3,25	3,94	3,54	
25-50	2,0	Volgens behoefte	0,87	1,05	1,27	1,53	1,85	2,24	2,71	3,28	2,95	Volgens behoefte en O2 niveau

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Zeer goede prestaties
- Zeer smakelijk
- Optische voercontrole



SAMENSTELLING:

Analyse (%)

Eiwit	50
Vet	15
Ruwe celstof	0,7
As	6,3
Totaal P	1,07

Maten:

2.0 mm

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	11667
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Bruto	21,4
Verteerbaar	19,0

VOERTABEL VOOR EEN LAGE VOERCONVERSIE (FCR):


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
15-25	2,0		0,93	1,13	1,37	1,65	2,00	2,42	2,92	3,53	3,18	
25-50	2,0	Volgens behoefte	0,82	1,00	1,20	1,46	1,76	2,13	2,58	3,11	2,80	Volgens behoefte en O2 niveau

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Hoog energie voer
- Hoge aantrekkingskracht
- Goede prestaties
- Ontworpen voor semi-intensive kweek
- Goed om in de herfst te voeren



SAMENSTELLING:

Analyse (%)

Eiwit	32
Vet	15
Ruwe celstof	2,2
As	12,4
Totaal P	2,13

Maten:

3.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
20.0 mm

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	10002
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Bruto	18,9
Verteerbaar	15,8

VOERTABEL VOOR EEN LAGE VOERCONVERSIE (FCR):


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
50-100	3.0	Volgens behoefte	0,83	1,00	1,21	1,47	1,77	2,14	2,59	3,14	2,82	Volgens behoefte en O2 niveau
100-250	4.5		0,65	0,78	0,94	1,14	1,38	1,67	2,02	2,44	2,20	
250-500	6.0		0,55	0,67	0,81	0,98	1,19	1,43	1,73	2,10	1,89	
500-1000	6.0		0,48	0,58	0,71	0,85	1,03	1,25	1,51	1,82	1,64	
1000-2000	8,0		0,42	0,51	0,61	0,74	0,90	1,09	1,31	1,59	1,43	

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Medium energie voer
- Ontworpen voor semi-intensive kweek
- Goede prestaties



SAMENSTELLING:

Analyse (%)

Eiwit	40	Maten:	3.0 mm
Vet	10		4.5 mm
Ruwe celstof	2,3		6.0 mm
As	10,9		9.0 mm
Totaal P	1,91		

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	10004
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Bruto	18,6
Verteerbaar	14,8

VOERTABEL VOOR EEN LAGE VOERCONVERSIE (FCR):


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
50-100	3.0		0,84	1,02	1,23	1,49	1,80	2,18	2,63	3,19	2,87	
100-250	4.5	Volgens behoefte	0,66	0,79	0,96	1,16	1,40	1,70	2,05	2,48	2,23	Volgens behoefte en O2 niveau
250-500	4.5		0,56	0,68	0,82	1,00	1,20	1,46	1,76	2,13	1,92	
500-1000	6.0		0,49	0,59	0,72	0,87	1,05	1,27	1,53	1,85	1,67	
1000-2000	9.0		0,43	0,52	0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,45	

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Semi-intensieve kweek
- Goede prestaties
- Zeer smakelijk
- Optische voercontrole



SAMENSTELLING:

Analyse (%)		Maten:
Eiwit	42	3.0 mm
Vet	13	4.5 mm
Ruwe celstof	3,3	6.0 mm
As	10,0	
Totaal P	1,03	

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	10000
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Bruto	19,5
Verteerbaar	15,8

VOERTABEL VOOR EEN LAGE VOERCONVERSIE (FCR):


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	26 °C
50-100	3,0		0,80	0,97	1,18	1,42	1,72	2,08	2,51	3,04	2,74	
100-250	4,5	Volgens behoefte	0,63	0,76	0,91	1,11	1,34	1,62	1,96	2,37	2,13	Volgens behoefte en O2 niveau
250-500	6,0		0,54	0,65	0,79	0,95	1,15	1,39	1,68	2,03	1,83	
500-1000	6,0		0,47	0,57	0,68	0,83	1,00	1,21	1,46	1,77	1,59	
1000-2000	6,0		0,41	0,49	0,60	0,72	0,87	1,05	1,27	1,54	1,39	

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waarden van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waarden zie het label.

- Ontworpen voor semi-intensive kweek
- Goede prestaties
- Optische voercontrole



SAMENSTELLING:

Analyse (%)

Eiwit	38	Maten:	4.5 mm
Vet	8		6.0 mm
Ruwe celstof	2,8		8.0 mm
As	12,0		
Totaal P	1,85		
Astaxanthin (mg/kg)	25		

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	10000
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Bruto	17,7
Verteerbaar	14,4

VOERTABEL VOOR EEN LAGE VOERCONVERSIE (FCR):


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
100-250	4.5		0,69	0,83	1,01	1,22	1,47	1,78	2,16	2,61	2,35	
250-500	6.0	Volgens behoefte	0,59	0,72	0,87	1,05	1,27	1,53	1,85	2,24	2,01	Volgens behoefte en O2 niveau
500-1000	6.0		0,52	0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,95	1,75	
1000-2000	8.0		0,45	0,54	0,66	0,79	0,96	1,16	1,40	1,70	1,53	

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Ouderdierenvoer
- Optimale ontwikkeling van de eitjes
- Hoge kwaliteit en overleving van de broed



SAMENSTELLING:

Analyse (%)

Eiwit	48	Maten:	6.0 mm
Vet	15		9.0 mm
Ruwe celstof	1,3		
As	10,5		
Totaal P	1,61		
Astaxanthin (mg/kg)	40		

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	25000
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Bruto	20,2
Verteerbaar	17,6

VOERTABEL VOOR EEN LAGE VOERCONVERSIE (FCR):


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
> 1500	6.0/9.0	Volgens behoefte	0,35	0,43	0,52	0,63	0,76	0,91	1,11	1,34	1,20	Volgens behoefte en O2 niveau

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.