

- Entwickelt für RAS und die Intensivzucht
- Höchste Leistung
- Hoch Energie Phasenzuführung
- Günstiges DP-DE Verhältnis



ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)	3.0 mm	4.5 mm	6.0 mm
Protein	41 - 44	41 - 43	40 - 43
Fett	29 - 32	30 - 33	31 - 34
Rohfaser	1 - 2	1 - 2	1 - 2
Asche	4 - 8	4 - 8	4 - 8
Gesamt P	0,94	0,94	0,94
Astaxanthine (mg/kg)	80	80	80

Vitamine zugesetzt

Vitamin A (IE/kg)	3.0 mm	4.5 mm	6.0 mm
Vitamin A (IE/kg)	10000	10000	10000

Energie (MJ/kg)

	3.0 mm	4.5 mm	6.0 mm
Gesamt	23,5 - 25,5	23,7 - 25,7	24,1 - 26,1
Verdaulich	21,8 - 22,2	22,0 - 22,3	22,2 - 22,6
Net Energie	16,8	17,1	17,4

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALE FUTTERVERWERTUNG

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0		0,70	0,85	1,03	1,25	1,51	1,82	1,48	
100-200	3.0/4.5		0,57	0,68	0,83	1,00	1,21	1,46	1,18	
200-300	4.5	Fütterung Je Appetit	0,51	0,62	0,75	0,90	1,09	1,32	1,07	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
300-400	4.5		0,48	0,58	0,70	0,84	1,02	1,23	1,00	
400-500	6.0		0,45	0,55	0,66	0,80	0,97	1,17	0,95	
500-750	6.0		0,43	0,52	0,63	0,76	0,92	1,11	0,90	
750-1000	6.0		0,40	0,48	0,58	0,71	0,85	1,03	0,84	
1000-1500	6.0		0,40	0,48	0,58	0,71	0,85	1,03	0,84	
1500-2000	6.0		0,37	0,45	0,54	0,65	0,79	0,96	0,78	
2000-3000	6.0		0,35	0,42	0,51	0,61	0,74	0,89	0,72	

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALES WACHSTUM


Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0		1,02	1,23	1,49	1,81	2,18	2,64	2,14	
100-200	3.0/4.5		0,82	0,99	1,20	1,45	1,75	2,12	1,72	
200-300	4.5	Fütterung Je Appetit	0,74	0,89	1,08	1,31	1,58	1,91	1,55	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
300-400	4.5		0,69	0,84	1,01	1,22	1,48	1,79	1,45	
400-500	6.0		0,66	0,80	0,96	1,16	1,41	1,70	1,38	
500-750	6.0		0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,30	
750-1000	6.0		0,58	0,70	0,85	1,02	1,24	1,50	1,21	
1000-1500	6.0		0,58	0,70	0,85	1,02	1,24	1,50	1,21	
1500-2000	6.0		0,54	0,65	0,78	0,95	1,15	1,39	1,12	
2000-3000	6.0		0,50	0,61	0,73	0,89	1,07	1,30	1,05	

* Futterempfehlung ist in % Biomasse/Trag.

* Die Futterempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.

Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.